

Informácia pre očkovaného.

Vakcína COMIRNATY Pfizer BioNTech.

Napriek tomu, že vakcína Comirnaty Vás chráni pred ochorením COVID-19, ako každý liek aj táto vakcína môže mať niektoré nežiadúce účinky, ktoré väčšinou trvajú 2-3 dni. Po druhej vakcíne je množstvo aj intenzita vedľajších účinkov o niečo vyššia ako po prvej vakcíne.

Medzi najčastejšie nežiadúce účinky patrí:

1. bolesťivosť a začervenanie v mieste vpichu,
2. pocit únavy,
3. bolesť hlavy,
4. celkovo bolesť svalov a kĺbov,
5. zvýšená telesná teplota alebo horúčka,
6. príznaky podobné chrípke.

Po očkovaní si na zmiernenie príznakov a ľahký priebeh nežiadúcich účinkov vyhradte čas tak, aby dva až tri dni ste nemali náročný program.

V prípade výskytu nežiadúcich účinkov:

1. Pri bolesti a začervenaní v mieste vpichu prikladajte studené obklady, zľahka umývajte postihnuté miesto vodou a mydlom. S ramenom cvičte.
2. Pri teplote, oddychujte a užite Paracetamol 500mg každých 6 hodín.
3. Pri bolesti kontaktujte svojho praktického lekára, aby Vám odporučil vhodné lieky proti bolesti.
4. Pri príznakoch podobných chrípke, oddychujte, pite viacej tekutín.
5. I keď zvýšená telesná teplota alebo mierna horúčka sa radia medzi nežiadúce účinky vakcíny, pri teplote nad 38,0 stupňov kontaktujte svojho lekára, aby zvážil ďalší postup.
6. **Kontaktujte svojho lekára aj pri iných pochybnostiach o Vašom zdravotnom stave po očkovaní, prípadne pri výskyte vyššie neuvedených nežiadúcich účinkoch.**

Vakcinačné miesto

Univerzitná nemocnica Bratislava