

## **POUČENIE PRE PACIENTA PO STABILIZÁCII CHRBTICE (L).**

Váž pacient, podrobili ste sa chirurgickému spevneniu drieku pre posun stavcov ako následok odstránenia platničky (-čiek) driekovej chrabtice v dôsledku ich znehodnotenia nadmerným opotrebením chrabtice.

Pokiaľ nenastane nepredvídateľná komplikácia, mal by byť výsledok operácie dlhodobo uspokojivý, aj keď možno nie dokonalý.

Príčinu ochorenia nie je možné chirurgicky odstrániť, iba jeho najhoršie následky.

Dvojica karbónových protéz v segmente chrabtice medzi driekovými stavcami by mala predĺžiť bezbolestný interval pri chôdzi a zmierniť doterajšie ľažkosti.

Nie je nutné protézy (nahradu platničky) v budúcnosti odstraňovať, ostáva trvalo.

S cieľom spomaliť, alebo zastaviť opotrebenie ďalších platničiek je vhodné dodržať niekoľko pravidiel:

- po operácii sa nesmie pacient prvé 4 dni postaviť, môže sa na lôžku otáčať.
  - pri priažnivom hojení je možné byť od 9. poop. dňa v domácom liečení
  - sedieť je možné po 6 týždňoch od operácie.
  - 8 týždňov od operácie pri chôdzi a sedení nosiť korzet
  - sedenie predĺžovať od 3x10 minút na dvojnásobky (ak sa nezvýrazní bolest) denne
  - chrániť sa pred chladom a pádom 8 týždňov od operácie
  - prvých 6-8 týždňov od operácie je dostatočnou rehabilitáciou chôdza
  - nie je vhodná intenzifikovaná RHB, dlhodobé sedenie a státie, dvíhanie bremien, tanec, prudké pohyby drieku do 8 týždňov od operácie (menej aktivity prináša viac)
  - voda na ranu môže prísť 2 dni po odstránení posledných stehov
  - prvé 3 mesiace od operácie je vhodná PN s obmedzením dlhodobého sedenia a státia
  - prvé 3 mesiace po operácii nie je vhodné rekreačne bicyklovať a plávať
  - prvé 3 mesiace od operácie nie je vhodné v rámci RHB aplikovať na ranu vlnké procedúry, robiť rotačné cviky (panva na jednú strany, hrudník opačne) a priamo masírovať pooperačnú ranu (spomaľuje hojenie, resp. sa môže vytvoriť nadmerná vnútorná jazva)
  - rehabilitácia prvé 3 mesiace je zameraná na liečebný uvoľňujúci telocvik a nácvik správnej chôdze
  - je nutné sledovať hmotnosť (obezita pretážuje oslabenú chrabticu)
  - je vhodné dlhodobo si udržiavať v kondícii chrabticové svalstvo
  - do kúpeľov sa chodí 6-18 mesiacov od operácie na nemocenskú -3 týždne
  - je vhodné v budúcnosti pravidelne chodiť do kúpeľov (1x za 2 roky)
  - po 3 mesiacoch je možné postupne obnoviť všetky pohybové aktivity v rekreačnej mieri,
- redukovať je nutné extremnú náamu, činnosť spojenú s nárazmi a otrasmami a prácu vo vynútených polohách bez možnosti odpočinku.